

Příloha T1 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

označení dílčí plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1 „hořečková louka“	0,28	<p>Horní a střední část louky. Ochránářsky zvláště významná plocha. Mozaika druhově bohatých porostů svazu <i>Violion caninae</i> (podhorské smilkové trávníky, T2.3B) a svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i> (mezofilní ovsíkové louky, T1.1). Převažující druhy trav: kostřava červená (<i>Festuca rubra</i>), ovsík vyvýšený (<i>Arrhenatherum elatius</i>), smilka tuhá (<i>Nardus stricta</i>), kostřava ovčí (<i>Festuca ovina</i>), třeslice prostřední (<i>Briza media</i>), v příměsi ostřice horská (<i>Carex montana</i>). Hojně zastoupené druhy bylin: máchelka srstnatá (<i>Leontodon hispidus</i>), bedrník větší (<i>Pimpinella major</i>), kontryhely (<i>Alchemilla</i> sp. – včetně <i>A. monticola</i>), chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i>), vítod obecný (<i>Polygala vulgaris</i>), mateřídouška vejčitá (<i>Thymus pulegioides</i>), hvozdík kropenatý (<i>Dianthus deltoides</i>), violka psí (<i>Viola canina</i>), třezalka skvrnitá (<i>Hypericum maculatum</i>), černohlávek obecný (<i>Prunella vulgaris</i>) a další. V příměsi škarda měkká čertkusolistá (<i>Crepis mollis</i> subsp. <i>succisifolia</i>).</p> <p>Cíl péče: trvale příznivé podmínky pro udržení vitální populace hořečku mnohotvarého českého (<i>Gentianella praecox</i> subsp. <i>bohemica</i>). V rámci možností podpora biodiverzity v travinobylinných biotopech.</p>	„Jarní obhospodařování“: Kosení lehkou mechanizací	1	Od druhé poloviny května do druhé poloviny června	1× za 2 roky
			„Podzimní obhospodařování“: Kosení lehkou mechanizací	1	Od přelomu října a listopadu do zámrazu	1× za 2 roky, v případě nadměrné expanze každoročně
			Rozrušování drnu strojově	1	Buď v předjaří v termínu od roztátí sněhu do 25. dubna nebo po podzimní seči s odstraněním biomasy, tj. v termínu od přelomu října a listopadu do zámrazu	1× za 1 rok
			Vyhrabávání organické hmoty a uvolňování písčitých ploch	2	Buď v předjaří v termínu od roztátí sněhu do 25. dubna, nebo po podzimní seči s odstraněním biomasy, tj. v termínu od přelomu října a listopadu do zámrazu	1× za 1 rok

označení díleč plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1 „hořečková louka“	0,28		Extenzivní pastva ovčí nebo koz (alternativní management)	1 (v případě nemožnosti zajistit kosení); 3 (v případě pravidelného kosení)	Vypasení ca do 2. poloviny června; alespoň 1× za 2 roky výpas v podzimním období (od konce října do zámrazu)	1× za 1 rok
			Likvidace invazní lupiny (vlčí bob mnoholistý)	2	V průběhu vegetační sezóny	Každoročně
2 „kulturní louka“	0,1006	<p>Spodní část louky. Druhově středně bohaté porosty mezofilních ovsíkových luk (svaz <i>Arrhenatherion elatioris</i>). V převaze druhy trav, zejména ovsík vyvýšený (<i>Arrhenatherum elatius</i>) a medyněk vlnatý (<i>Holcus lanatus</i>), dále se vyskytují kostřava červená (<i>Festuca rubra</i>), srha říznačka (<i>Dactylis glomerata</i>), kostřava luční (<i>Festuca rubra</i>), psineček tenký (<i>Agrostis capillaris</i>). Z bylinných druhů hojně jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i>), jetel luční (<i>Trifolium pratense</i>), máchelka srstnatá (<i>Leontodon hispidus</i>), škarda dvouletá (<i>Crepis biennis</i>), pryskyřník prudký (<i>Ranunculus acris</i>). V lemech na kontaktu s liskovými křovinami vyšší zastoupení nitrofilních druhů: kerblík lesní (<i>Anthriscus sylvestris</i>) a bršlice kozí noha (<i>Aegopodium podagraria</i>). Expanze hasivky orličí (<i>Pteridium aquilinum</i>).</p> <p>Cíl péče: udržení nelesní plochy, podpora biodiverzity v travinobylinných biotopech.</p>	Kosení lehkou mechanizací	1	Od druhé poloviny května do druhé poloviny června a od září do října	2× za 1 rok
			Extenzivní pastva ovčí nebo koz (alternativní management)	1 (v případě nemožnosti zajistit kosení); 3 (v případě pravidelného kosení)	Rotační přepásání v každém ročním období (např. duben až listopad)	1× za 1 rok
			Rozrušování drnu strojově	1	Buď v předjaří v termínu od roztátí sněhu do 25. dubna nebo po podzimní seči s odstraněním biomasy, tj. v termínu od přelomu října a listopadu do zámrazu	1× za 1 rok

označení dílečků plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
3 „lem louky s náletem dřevin“	0,027	<p>Dřevinné porosty s lískou obecnou (<i>Corylus avellana</i>), javorem klenem (<i>Acer pseudoplatanus</i>), borovicí lesní (<i>Pinus sylvestris</i>), břízou bělokorou (<i>Betula pendula</i>), střemchou obecnou (<i>Prunus padus</i>), vrbou jívou (<i>Salix caprea</i>), jeřábem ptačím (<i>Sorbus aucuparia</i>), bezem hroznatým (<i>Sambucus racemosa</i>) aj. Na kontaktu s borovým lesem v podrostu hojně brusnice borůvka (<i>Vaccinium myrtillus</i>), slabá expanze hasivky orličí (<i>Pteridium aquilinum</i>). V návaznosti na spodní okraj louky převaha nitrofilních druhů v podrostu: kopřiva dvoudomá (<i>Urtica dioica</i>), bršlice kozí noha (<i>Aegopodium podagraria</i>), svízel přitula (<i>Galium aparine</i>) a pýr plazivý (<i>Elytrigia repens</i>).</p> <p>Cíl péče: průběžné selektivní vyřezávky náletových dřevin za účelem zachování rozlohy nelesních ploch (DP 1 a 2) a omezení nežádoucího stínění travinobylinných porostů.</p>	Výřez náletových dřevin (selektivní vyřezávky dřevin zasahujících do nelesních ploch)	3	Mimo vegetační období (říjen až březen)	1× za 10 let